



CENTRO VETERINARIO A MAROSA

¿QUÉ ES LA DERMATITIS ALÉRGICA A PICADURA DE PULGA?

Como su propio nombre indica es una respuesta alérgica debida a la saliva de insectos picaduras, especialmente a la saliva de pulga.

Esta alergia se manifiesta tras la exposición continuada a la saliva de pulga, motivo por el cual es algo menos frecuente en animales jóvenes, aunque pueden verse casos.

Independientemente de la zona donde se produzca la picadura, el síntoma más característico de esta enfermedad es un picor severo localizado, en el caso de los perros, en el tercio posterior del animal: zona próxima a la inserción de la cola, muslos, ingles y sin afectación de otra región corporal. Mientras que en los gatos pueden darse presentaciones muy diversas (dermatitis eosinofílica, dermatitis miliar), pudiendo verse afectada distintas regiones corporales, lo que puede complicar el diagnóstico.



En algunos animales la DAPP coexiste con otras dermatitis alérgicas y pueden aparecer lesiones en otras regiones corporales. Además, como consecuencia del rascado y del mordisqueo pueden aparecer infecciones cutáneas bacterianas o fúngicas que deben ser tratadas de forma adecuada.

Existen pruebas laboratoriales que permiten confirmar el padecimiento de una DAPP, pero por norma general, la existencia de un cuadro compatible junto con ciertos factores predisponentes (control de pulgas irregular, animales en contacto con otros animales no controlados, mascotas con acceso al exterior, estación de alto riesgo, etc) y una buena respuesta al tratamiento confirma el diagnóstico.

El propietario debe entender que el padecimiento de la DAPP no implica necesariamente que exista un mal manejo sanitario o higiénico por parte del propietario ya que las picaduras de pulga pueden ser habituales en determinadas regiones y estaciones del año, por ello no debe constituir un estigma para su mascota ni para el propietario.

Cómo en la mayor parte de los procesos alérgicos, no existe un tratamiento curativo y la opción más eficaz para controlar los síntomas pasa por evitar el contacto con las pulgas siempre que sea posible. El resto del tratamiento médico persigue:

1. Tratar las infecciones bacterianas o fúngicas secundarias al rascado.
2. Control del prurito o picor a corto plazo.
3. Control exhaustivo de pulgas sobre el animal de forma regular.
4. Control exhaustivo de pulgas sobre los animales que conviven con el paciente.
5. Control exhaustivo de pulgas sobre el medio ambiente.

Es importante recordar a los propietarios que aunque los esteroides son de gran utilidad en el control del prurito, presentan una serie de inconvenientes (aumento de peso, aumento del riesgo de padecer diabetes, pancreatitis, alteración del sistema inmunitario y un largo etc) que los convierten en un arma de doble filo. Un propietario responsable debe tener presente que si reaparece el prurito es porque el animal sigue en contacto con pulgas o porque pueda presentar otro proceso al mismo tiempo (infecciones, otras dermatitis alérgicas, etc), pero, en cualquier caso, los esteroides no son una solución del mismo y a largo plazo el problema se exacerbará y complicará su control.

Germán Quintana Diez

Servicio de Dermatología
Centro Veterinario A Marosa

¿De dónde vienen las pulgas que tiene mi perro?

Dependiendo del lugar donde viva usted y de la época del año, las pulgas pueden proceder de varios sitios:



- Su jardín
- Parques públicos
- Playas
- Zonas de juegos
- Bosques
- Su casa

Las infestaciones por pulgas se producen a partir de un entorno contaminado, y cualquier zona se puede contaminar muy rápidamente.

Las pulgas saltan sobre su animal y empiezan a alimentarse en tan solo unos segundos. **Ningún producto contra las pulgas puede impedir que todas o la mayoría de las pulgas piquen**^{4, 5}. Pasadas 24 horas desde que se alimentó por primera vez, la pulga ya se ha apareado y empieza a poner unos 40 a 50 huevos diarios, infestando así todo el hogar¹.

